



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय  
रायपुर



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 03-04-2023

महासमुंद्र(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-04-03 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-04-04	2023-04-05	2023-04-06	2023-04-07	2023-04-08
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	37.0	37.0	38.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	21.0	21.0	22.0	22.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	60	60
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	20	20	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5.0	6.0	4.0	5.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	248	243	214	202	214
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	0	3	7

### मौसम सारांश / चेतावनी:

डीएसएस से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 5 दिनों में महासमुंद्र जिलों में 3.0 मिमी बारिश होगी। क्लाउड राशि 0-87.5% होगी। अधिकतम तापमान 38.0 0 C के बीच और न्यूनतम तापमान 21.0-22.0 0 C के बीच भिन्न होगा। सापेक्ष आर्द्रता 20-70% भिन्न होगी। हवा की गति लगभग 6.0 किमी प्रति घंटा रहेगी और हवा की दिशा पश्चिमी रहेगी।

### सामान्य सलाहकार:

एग्रोमेट एडवाइजरी प्राप्त करने के लिए, किसानों से अनुरोध है कि वे ऐप को डाउनलोड करें और उसमें अपना पंजीकरण कराएं। लिंक - (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>)

### लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में बारिश के कारण फसलों में कीटनाशक और कवकनाशी का छिड़काव न करें। कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद्र छत्तीसगढ़।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की फसल परिपक्वता अवस्था में है इसलिए फसल की कटाई करें और इसे 12% नमी की मात्रा तक सुखाकर सूखे नीम के पत्तों के साथ जमा करें।
चावल	गर्मियों में चावल में स्टीम बोरर का हमला देखा गया है। क्लोरोफाइरीफॉस 1.5 मिली/लीटर पानी में डालें।
चावल	ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई की जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि रेनएक्सपायर (फेरटेरा) @ 10 किग्रा/हेक्टेयर का छिड़काव करें। या करतप @ 20 किग्रा/हेक्टेयर तना छेदक के हमले के नियंत्रण के लिए।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
लौकी	कद्दू वर्गीय परिवार की फसलें जैसे लौकी, कद्दू, तुरई, चिता आदि में चूर्णिल फफूंदी रोग के नियंत्रण के लिए कैराथेन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
टमाटर	टमाटर के खेत में जीवाणु मुरझान देखा जाता है, किसान इस रोग को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं जड़ों के पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड @ 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है।
अमरूद	फलों के पेड़ लगाने के लिए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अप्रैल और मई के महीनों में एक गड्ढा खोदकर छोड़ दें और वर्षा के बाद पौधे लगा दें।
भिण्डी	भिण्डी में, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बुवाई के 10-15 दिनों के बाद 50 किलोग्राम ताजा गाय के गोबर के घोल को 1 किलोग्राम प्रति 10 लीटर पानी में डालें।
मिर्च	किसानों के खेतों में मिर्च में लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप देखा जाता है, इस रोग से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिली प्रति लीटर पानी या एसिटामिप्रिड 20% एसपी @ 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बढ़ते तापमान को देखते हुए किसानों को पशुओं के लिए साफ और ठंडा पानी उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है।

**अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:**

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	कीट, रोगजनक और खरपतवार की रोकथाम के लिए सभी परती खेत में गहरी गर्मी की जुताई मोल्ड बोर्ड हल की मदद से की जानी चाहिए।
सामान्य सलाह	आकाशीय बिजली व गरज से बचाव के लिए किसानों से अनुरोध है कि दामिनी एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें. यह ऐप 40 किमी क्षेत्र में बिजली गिरने और गरजने के 30 मिनट पहले भविष्यवाणी कर देगा।



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय  
रायपुर



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 06-04-2023

महासमुंद(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-04-06 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-04-07	2023-04-08	2023-04-09	2023-04-10	2023-04-11
वर्षा (मिमी)	1.0	0.0	4.0	2.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	37.0	36.0	34.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	22.0	23.0	22.0	23.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	65	60	65	60
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5.0	4.0	3.0	4.0	3.0
पवन दिशा (डिग्री)	289	158	243	248	281
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	5	5	3	3

### मौसम सारांश / चेतावनी:

डीएसएस से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 5 दिनों में महासमुंद जिलों में 4.0 मिमी बारिश होगी। क्लाउड राशि 37.5-62.5% होगी। अधिकतम तापमान 36.0 0 C के बीच और न्यूनतम तापमान 22.0-23.0 0 C के बीच भिन्न होगा। सापेक्ष आर्द्रता 25-65% भिन्न होगी। हवा की गति लगभग 5.0 किमी प्रति घंटा रहेगी और हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम रहेगी।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर दें। जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, साथ ही यदि फसल कट चुकी है तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें।

### लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि यदि संभव हो तो पशुओं को बारिश के दौरान घर के अंदर ही रखें और उन्हें शेड के अंदर ही खुला छोड़ दें। कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद छत्तीसगढ़।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई की जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि रेनएक्सपायर (फेरटेरा) @ 10 किग्रा/हेक्टेयर का छिड़काव करें। या करतप @ 20 किग्रा/हेक्टेयर तना छेदक के हमले के नियंत्रण के लिए।
चावल	गर्मियों में चावल में स्टीम बोरर का हमला देखा गया है। क्लोरोफाइरीफॉस 1.5 मिली/लीटर पानी में डालें।
गेहूं	गेहूं की फसल परिपक्वता अवस्था में है इसलिए फसल की कटाई करें और इसे 12% नमी की मात्रा तक सुखाकर सूखे नीम के पत्तों के साथ जमा करें।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
लौकी	कद्दू वर्गीय परिवार की फसलें जैसे लौकी, कद्दू, तुरई, चिता आदि में चूर्णिल फफूंदी रोग के नियंत्रण के लिए कैराथेन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
टमाटर	टमाटर के खेत में जीवाणु मुरझान देखा जाता है, किसान इस रोग को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं जड़ों के पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड @ 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है।
अमरूद	फलों के पेड़ लगाने के लिए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अप्रैल और मई के महीनों में एक गड्ढा खोदकर छोड़ दें और वर्षा के बाद पौधे लगा दें।
भिण्डी	भिण्डी में, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बुवाई के 10-15 दिनों के बाद 50 किलोग्राम ताजा गाय के गोबर के घोल को 1 किलोग्राम प्रति 10 लीटर पानी में डालें।
मिर्च	किसानों के खेतों में मिर्च में लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप देखा जाता है, इस रोग से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिली प्रति लीटर पानी या एसिटामिप्रिड 20% एसपी @ 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बढ़ते तापमान को देखते हुए किसानों को पशुओं के लिए साफ और ठंडा पानी उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है।
गाय	पशुशाला में स्वच्छ व ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जाए। अगर बाहर थोड़ा पानी रखना हो पशुशाला, इसे छायादार स्थान पर रखना चाहिए।

**अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:**

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	कीट, रोगजनक और खरपतवार की रोकथाम के लिए सभी परती खेत में गहरी गर्मी की जुताई मोल्ड बोर्ड हल की मदद से की जानी चाहिए।
सामान्य सलाह	आकाशीय बिजली व गरज से बचाव के लिए किसानों से अनुरोध है कि दामिनी एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यह ऐप 40 किमी क्षेत्र में बिजली गिरने और गरजने के 30 मिनट पहले भविष्यवाणी कर देगा।
सामान्य सलाह	बेल वाली सब्जियों को उचित सहारा देना चाहिए और लौकी की फसल को खाद देना चाहिए।



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय  
रायपुर



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-04-2023

महासमुंद(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-04-11 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-04-12	2023-04-13	2023-04-14	2023-04-15	2023-04-16
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	39.0	40.0	40.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	25.0	26.0	26.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	63	62	58	55	55
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	23	22	20	20	18
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	5	5	5	6
पवन दिशा (डिग्री)	68	0	135	165	248
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	1	1	3	7

### मौसम सारांश / चेतावनी:

डीएसएस से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 5 दिनों में महासमुंद जिलों में 0.0 मिमी बारिश होगी। क्लाउड राशि 0-87.5% होगी। अधिकतम तापमान 40.0 0 C के बीच और न्यूनतम तापमान 25.0-27.0 0 C के बीच भिन्न होगा। सापेक्ष आर्द्रता 18-63% भिन्न होगी। हवा की गति लगभग 6.0 किमी प्रति घंटा रहेगी और हवा की दिशा दक्षिण-पश्चिम होगी।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए धान की फसल की निगरानी करने की सलाह दी गई है। कीट का प्रकोप होने पर उपरोक्त कीटनाशक का छिड़काव मौसम साफ होने पर करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई करें। इसके बाद यदि बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी न हो तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद सी.जी.

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	गर्मियों में धान के किसानों को स्टेम बोरर के नियंत्रण के लिए खेत के पास फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप लगाने की सलाह दी जाती है। राइनएक्सपायर @ 150 ग्राम/हेक्टेयर का छिड़काव करें। या फिप्रोनिल 5 एस.सी. के नियंत्रण के लिए 1 लीटर तना छेदक आक्रमण. (बूटिंग चरण)
मूँग	ग्रीष्म मूँग की फसल के लिए बीज दर 25-30 किग्रा. प्रति हे. बीज बोने से पूर्व ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम कल्चर एवं पीएसबी से उपचारित करना चाहिए। बीज को 5-10 ग्राम कल्चर प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
काला चना	ग्रीष्मकालीन काले चने की फसल के लिए बीज दर 15-20 किग्रा. प्रति हे. बीज बोने से पूर्व ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम कल्चर एवं पीएसबी से उपचारित करना चाहिए। बीज को 5-10 ग्राम कल्चर प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित करें।
तिल	ग्रीष्मकालीन तिल फसल बीज दर 5-7 किग्रा. प्रति हे. बुवाई से पहले हेक्साकोनाजोल की मात्रा 1 मिली प्रति किलो बीज की दर से रखनी चाहिए। प्रति किग्रा. इसके बाद Azospirillum और PSB का नंबर आता है। कल्चर 5-10 ग्राम प्रति किग्रा. इसके अनुसार बीज का उपचार कर बुआई करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों की फसलों में एफिड का प्रकोप होने की संभावना है। इसके लिए निरंतर निगरानी रखें और शुरुआती प्रकोप को देखते हुए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें।
भिण्डी	फरवरी में बोई जाने वाली फसलों जैसे भिंडी, लोबिया और ग्वारबीन की फसलों में इंटरकल्चर ऑपरेशन किया जाना चाहिए।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	पोल्ट्री शेड और पशु शेड में ताजी हवा के लिए खिड़कियों की व्यवस्था करें।
गाय	पशुशाला में स्वच्छ व ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जाए। यदि पशुशाला के बाहर कुछ पानी रखना हो तो उसे छायादार स्थान पर रखना चाहिए।



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय  
रायपुर



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 13-04-2023

महासमुंद(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-04-13 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-04-14	2023-04-15	2023-04-16	2023-04-17	2023-04-18
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	40.0	41.0	41.0	42.0	41.0
न्यूनतम तापमान(से.)	22.0	22.0	23.0	23.0	22.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	62	60	62	65	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	15	18	20	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	4	4	5	4
पवन दिशा (डिग्री)	292	285	180	116	118
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	3	4	4	4

### मौसम सारांश / चेतावनी:

डीएसएस से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 5 दिनों में महासमुंद जिलों में 0.0 मिमी बारिश होगी। क्लाउड राशि 12.5-50% होगी। अधिकतम तापमान 42.0 0 C के बीच और न्यूनतम तापमान 22.0-23.0 0 C के बीच भिन्न होगा। सापेक्ष आर्द्रता 18-70% भिन्न होगी। हवा की गति लगभग 5.0 किमी प्रति घंटा रहेगी और हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम रहेगी।

### सामान्य सलाहकार:

पिछले सप्ताह (5-8 मिमी/दिन) के दौरान वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हुई है और इस प्रकार चावल, मूंगफली, सब्जियों जैसी रबी फसलों की पानी की आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है। इसलिए, उच्च तापमान या थर्मल तनाव के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए फसल चंदवा के भीतर उचित मिट्टी-नमी और सूक्ष्म जलवायु बनाए रखने के लिए दो सिंचाई के बीच के अंतराल को कम करने की सलाह दी जाती है।

### लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना को देखते हुए थ्रिप्स कीटों पर नजर रखें। कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद छत्तीसगढ़।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	गर्मियों में धान के किसानों को स्टेम बोरर के नियंत्रण के लिए खेत के पास फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप लगाने की सलाह दी जाती है। राइनएक्सपायर @ 150 ग्राम/हेक्टेयर का छिड़काव करें। या फिप्रोनिल 5 एस.सी. के नियंत्रण के लिए 1 लीटर तना छेदक आक्रमण. (बूटिंग चरण)
मूँग	ग्रीष्म मूँग की फसल के लिए बीज दर 25-30 किग्रा. प्रति हे. बीज बोने से पूर्व ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम कल्चर एवं पीएसबी से उपचारित करना चाहिए। बीज को 5-10 ग्राम कल्चर प्रति किग्रा बीज की दर से

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	उपचारित करें।
काला चना	ग्रीष्मकालीन काले चने की फसल के लिए बीज दर 15-20 किग्रा. प्रति हे. बीज बोने से पूर्व ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम कल्चर एवं पीएसबी से उपचारित करना चाहिए। बीज को 5-10 ग्राम कल्चर प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित करें।
तिल	ग्रीष्मकालीन तिल फसल बीज दर 5-7 किग्रा. प्रति हे. बुवाई से पहले हेक्साकोनाजोल की मात्रा 1 मिली प्रति किलो बीज की दर से रखनी चाहिए। प्रति किग्रा. इसके बाद Azospirillum और PSB का नंबर आता है। कल्चर 5-10 ग्राम प्रति किग्रा. इसके अनुसार बीज का उपचार कर बुआई करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों की फसलों में एफिड का प्रकोप होने की संभावना है। इसके लिए निरंतर निगरानी रखें और शुरुआती प्रकोप को देखते हुए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें।
भिण्डी	फरवरी में बोई जाने वाली फसलों जैसे भिंडी, लोबिया और ग्वारबीन की फसलों में इंटरकल्चर ऑपरेशन किया जाना चाहिए।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	पोल्ट्री शेड और पशु शेड में ताजी हवा के लिए खिड़कियों की व्यवस्था करें।
गाय	पशुशाला में स्वच्छ व ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जाए। अगर बाहर थोड़ा पानी रखना हो पशुशाला, इसे छायादार स्थान पर रखना चाहिए।





**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय  
रायपुर



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 18-04-2023

महासमुंद(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-04-18 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-04-19	2023-04-20	2023-04-21	2023-04-22	2023-04-23
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	4.0	1.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	44.0	43.0	42.0	41.0	40.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	24.0	23.0	22.0	23.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	55	60
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	15	15	15	20	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	4	6	6	6
पवन दिशा (डिग्री)	292	270	292	210	292
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	5	4	6

### मौसम सारांश / चेतावनी:

डीएसएस से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 5 दिनों में महासमुंद जिलों में 4.0 मिमी बारिश होगी। क्लाउड राशि 12.5-75% होगी। अधिकतम तापमान 43.0 0 C के बीच और न्यूनतम तापमान 23.0-24.0 0 C के बीच भिन्न होगा। सापेक्ष आर्द्रता 15-60% भिन्न होगी। हवा की गति लगभग 6.0 किमी प्रति घंटा रहेगी और हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम रहेगी।

### सामान्य सलाहकार:

एग्रोमेट एडवाइजरी प्राप्त करने के लिए, किसानों से अनुरोध है कि वे ऐप को डाउनलोड करें और उसमें अपना पंजीकरण कराएं। लिंक - (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>)

### लघु संदेश सलाहकार:

किसान वर्तमान समय में अपने खेत का परीक्षण करवा लें, इस कार्य के लिए उन्हें कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	गर्मियों में धान के खेत की सिंचाई कर दें और पुष्पगुच्छ निकलने से पहले यूरिया खाद सबसे अंत में डालें।
चावल	आगामी खरीफ सीजन में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें चावल की अच्छी उपज प्राप्त करें। 3 वर्ष के अंतराल पर 1 बार गहरी जुताई करें।
चावल	गर्मियों में चावल में स्टीम बोरर का हमला देखा गया है। क्लोरोफाइरीफॉस @ 1.5 मिली/लीटर पानी में डालें।
कुटकी	ग्रीष्मकालीन रागी फसल में हल्की गुड़ाई करके 2.50 किग्रा प्रति एकड़ नाइट्रोजन की टाप ड्रेसिंग और गुलाबी तना छेदक के हमले को रोकने के लिए फिप्रोनिल 5 एससी। 2 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	तुरंत छिड़काव करें।
मूँग	मूँग की बुवाई के लिए गर्मी का समय अनुकूल है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि सिंचित क्षेत्रों में गेहूं/चना की कटाई के बाद मूँग की बुवाई जल्द से जल्द पूरी कर लें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	बैंगन की खेती में रुचि रखने वाले किसान बैंगन की पौध के लिए खेत की तैयारी और नर्सरी की बुवाई शुरू कर सकते हैं। नर्सरी में 10 किग्रा गोबर की खाद और 1 किग्रा नीम की खली डालें। किसानों को बेहतर अंकुरण के लिए ट्राइकोडर्मा विर्टी जैसे उचित जैव एजेंटों के साथ बीजों का उपचार करना चाहिए।
टमाटर	टमाटर के खेत में जीवाणु मुरझान देखा जाता है, किसान इस रोग को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं जड़ों के पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड @ 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बढ़ते तापमान को देखते हुए किसानों को पशुओं के लिए साफ और ठंडा पानी उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है।
गाय	पशुशाला में स्वच्छ व ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जाए। अगर बाहर थोड़ा पानी रखना हो पशुशाला, इसे छायादार स्थान पर रखना चाहिए।



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय  
रायपुर



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 21-04-2023

महासमुंद(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-04-21 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-04-22	2023-04-23	2023-04-24	2023-04-25	2023-04-26
वर्षा (मिमी)	3.0	6.0	1.0	7.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	38.0	38.0	38.0	39.0	39.0
न्यूनतम तापमान(से.)	22.0	21.0	22.0	22.0	22.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	25	25	25	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	6	6	4	5
पवन दिशा (डिग्री)	216	236	161	251	210
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	5	1	6	6

### मौसम सारांश / चेतावनी:

डीएसएस से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 5 दिनों में महासमुंद जिलों में 7.0 मिमी बारिश होगी। क्लाउड राशि 12.5-75% होगी। अधिकतम तापमान 39.0 0 C के बीच और न्यूनतम तापमान 21.0-22.0 0 C के बीच भिन्न होगा। सापेक्ष आर्द्रता 25-70% भिन्न होगी। हवा की गति लगभग 6.0 किमी प्रति घंटा रहेगी और हवा की दिशा दक्षिण-पश्चिम होगी।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में मध्यम बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना के कारण ग्रीष्मकालीन चावल की फसल में तना छेदक का प्रकोप बढ़ सकता है। अतः इसकी निरन्तर निगरानी करनी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए।

### लघु संदेश सलाहकार:

बढ़ते तापमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं को छाया में रखें और उन्हें नियमित रूप से पानी पिलाएं। कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद छत्तीसगढ़।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	गर्मियों में धान के खेत की सिंचाई कर दें और पुष्पगुच्छ निकलने से पहले यूरिया खाद सबसे अंत में डालें।
चावल	आगामी खरीफ सीजन में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें चावल की अच्छी उपज प्राप्त करें। 3 वर्ष के अंतराल पर 1 बार गहरी जुताई करें।
चावल	गर्मियों में चावल में स्टीम बोरर का हमला देखा गया है। क्लोरोफाइरीफॉस @ 1.5 मिली/लीटर पानी में डालें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
कोदो	ग्रीष्मकालीन रागी फसल में हल्की गुड़ाई करके 2.50 किग्रा प्रति एकड़ नाइट्रोजन की टाप ड्रेसिंग और गुलाबी तना छेदक के हमले को रोकने के लिए फिप्रोनिल 5 एससी। 2 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर तुरंत छिड़काव करें।
मूँग	मूँग की बुवाई के लिए गर्मी का समय अनुकूल है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि सिंचित क्षेत्रों में गेहूं/चना की कटाई के बाद मूँग की बुवाई जल्द से जल्द पूरी कर लें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	बैंगन की खेती में रुचि रखने वाले किसान बैंगन की पौध के लिए खेत की तैयारी और नर्सरी की बुवाई शुरू कर सकते हैं। नर्सरी में 10 किग्रा गोबर की खाद और 1 किग्रा नीम की खली डालें। किसानों को बेहतर अंकुरण के लिए ट्राइकोडर्मा विर्टी जैसे उचित जैव एजेंटों के साथ बीजों का उपचार करना चाहिए।
टमाटर	टमाटर के खेत में जीवाणु मुरझान देखा जाता है, किसान इस रोग को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं जड़ों के पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड @ 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है।
आम	बाग में रुचि रखने वाले किसानों को 1x1x1 मीटर आकार के गड्ढे तैयार कर खेत तैयार करने चाहिए उचित सौर सौरकरण के बाद। फलों की उपयुक्त किस्मों का चुनाव किया जाना चाहिए और वृक्षारोपण किया जाना चाहिए तदनुसार किया।
पपीता	पपीते की खेती के लिए यह सही समय है। इन्हें पॉलीबैग में लगाया जाना चाहिए ताकि मानसून की शुरुआत में इन्हें मुख्य खेतों में लगाया जा सके। पपीते के लिए उपयुक्त किस्में पूसा नन्हा, पूसा बौनी हैं।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	प्रातः 10 बजे के बाद एवं अपराह्न 3 बजे के पूर्व खुले स्थान पर पशुओं को न चरायें।
गाय	बढ़ते तापमान को देखते हुए किसानों को पशुओं के लिए साफ और ठंडा पानी उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है।
गाय	पशुशाला में स्वच्छ व ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जाए। अगर बाहर थोड़ा पानी रखना हो पशुशाला, इसे छायादार स्थान पर रखना चाहिए।



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय  
रायपुर



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-04-2023

महासमुंद(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-04-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-04-26	2023-04-27	2023-04-28	2023-04-29	2023-04-30
वर्षा (मिमी)	0.0	5.0	12.0	0.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	37.0	38.0	37.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	25.0	26.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	73	82	82	73	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	29	32	29	24	28
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	5	6	6	5	6
पवन दिशा (डिग्री)	191	208	161	248	292
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	5	6

### मौसम सारांश / चेतावनी:

डीएसएस से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 5 दिनों में महासमुंद जिलों में 12.0 मिमी बारिश होगी। क्लाउड राशि 62.5-75% होगी। अधिकतम तापमान 38.0 0 C के बीच और न्यूनतम तापमान 24.0-25.0 0 C के बीच भिन्न होगा। सापेक्ष आर्द्रता 28-82% भिन्न होगी। हवा की गति लगभग 6.0 किमी प्रति घंटा रहेगी और हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम रहेगी।

### सामान्य सलाहकार:

एग्रोमेट एडवाइजरी प्राप्त करने के लिए, किसानों से अनुरोध है कि वे ऐप को डाउनलोड करें और उसमें अपना पंजीकरण कराएं। लिंक - (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>)

### लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है इसलिए इन दिनों में कीटनाशक का छिड़काव न करें। कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद छत्तीसगढ़।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	आगामी खरीफ सीजन में धान की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। 3 वर्ष के अंतराल पर 1 बार गहरी जुताई करें।
सामान्य सलाह	गर्मियों में धान के खेत की सिंचाई कर दें और पुष्पगुच्छ निकलने से पहले यूरिया खाद सबसे अंत में डालें।
मिट्टी परीक्षण	किसान वर्तमान समय में अपने खेत का परीक्षण करवा लें, इस कार्य के लिए उन्हें कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तिलहन और दलहन की फसल की कटाई के बाद थ्रेशिंग करें। दानों में नमी 8-10 प्रतिशत ही रहनी चाहिए, इसलिए बीजों को धूप में सुखाना चाहिए।
पौध - संरक्षण	आम के एन्थ्रेक्नोज रोग को नियंत्रित करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कवकनाशी @ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर देना चाहिए।
सामान्य सलाह	तरबूज की फसल में यदि दरारें दिखाई दे रही हों तो नियमित अंतराल पर सिंचाई और बोरॉन का पर्णाय छिड़काव करने का प्रयास करें।
सामान्य सलाह	भिंडी के लिए शुरुआती अवस्था में पीलापन नोटिस करता है। यदि पीलापन सीमित पौधे में है पौधे को हटा दें और उन्हें जला दें। इसके अलावा, गंभीर संक्रमण के लिए स्प्रे करें डाइमिथोएट 30 ई.सी. @ 1.5 मीटर लीटर/लीटर सुबह या शाम के समय।
सामान्य सलाह	बढ़ते तापमान को देखते हुए किसानों को पशुओं के लिए साफ और ठंडा पानी उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है।



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय  
रायपुर



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-04-2023

महासमुंद(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-04-28 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-04-29	2023-04-30	2023-05-01	2023-05-02	2023-05-03
वर्षा (मिमी)	2.0	2.0	3.0	4.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	35.0	35.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	24.0	24.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	83	83	88	88	88
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	38	38	38
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	6	7	6	6
पवन दिशा (डिग्री)	270	285	210	202	315
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	7	7	6	5

### मौसम सारांश / चेतावनी:

डीएसएस से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 5 दिनों में महासमुंद जिलों में 5.0 मिमी बारिश होगी। क्लाउड राशि 62.5-87.5% होगी। अधिकतम तापमान 36.0 0 C के बीच और न्यूनतम तापमान 23.0-24.0 0 C के बीच भिन्न होगा। सापेक्ष आर्द्रता 35-88% भिन्न होगी। हवा की गति लगभग 7.0 किमी प्रति घंटा रहेगी और हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम रहेगी।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में मध्यम से घने बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना के कारण ग्रीष्मकालीन चावल की फसल में तना छेदक का प्रकोप बढ़ सकता है। अतः इसकी निरन्तर निगरानी करनी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए।

### लघु संदेश सलाहकार:

बेल वाली सब्जियों को उचित सहारा देना चाहिए और लौकी की फसल को खाद देना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद छत्तीसगढ़।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तिलहन और दलहन की फसल की कटाई के बाद थ्रेशिंग करें। दानों में नमी 8-10 प्रतिशत ही रहनी चाहिए, इसलिए बीजों को धूप में सुखाना चाहिए।
मक्का	मक्के की फसल में लीफ ब्लास्ट रोग के नियंत्रण के लिए मेटालेक्सल @ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
मक्का	कृषकों को सलाह दी जाती है कि मक्का की फसल हेतु अनुशंसित किस्मों की बुआई करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	गर्मियों में धान के किसानों को तना छेदक के नियंत्रण की सलाह दी जाती है। Rynexpyr 20% SC @ 150 ग्राम / हेक्टेयर का छिड़काव करें। या तना छेदक के हमले के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 5% एससी @ 1 लीटर/हेक्टेयर।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
पपीता	पपीते की खेती के लिए यह सही समय है। इन्हें पॉलीबैग में लगाया जाना चाहिए ताकि मानसून की शुरुआत में इन्हें मुख्य खेतों में लगाया जा सके। पपीते के लिए उपयुक्त किस्में पूसा नन्हा, पूसा बौनी हैं।
आम	आम के एन्थ्रेक्नोज रोग को नियंत्रित करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कवकनाशी @ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालना चाहिए।
भिण्डी	भिण्डी के लिए शुरुआती अवस्था में पीलापन नोटिस करता है। यदि सीमित पौधों में पीलापन है तो पौधे को हटाकर जला दें। इसके अलावा, गंभीर संक्रमण के लिए डाइमैथोएट 30 ई.सी. @ 1.5 मि.ली./लीटर की दर से सुबह या शाम के समय छिड़काव करें।
शकरकंद	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे ग्रीष्मकालीन शकरकंद की बुआई तुरंत शुरू कर दें।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
मिट्टी परीक्षण	किसान वर्तमान समय में अपने खेत का परीक्षण करवा लें, इस कार्य के लिए उन्हें कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
सामान्य सलाह	मेघदूत- एग्रोमेट एडवाइजरी प्राप्त करने के लिए किसानों से अनुरोध है कि वे ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपना पंजीकरण कराएं। लिंक - ( <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot</a> )
सामान्य सलाह	आकाशीय बिजली व गरज से बचाव के लिए किसानों से अनुरोध है कि दामिनी एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यह ऐप 40 किमी क्षेत्र में बिजली गिरने और गरजने के 30 मिनट पहले भविष्यवाणी कर देगा।